

Medicinpakkerne



Indhold





























































- Hvad er en patientsikkerhedspakke?
- Indikatorer – hvordan var det nu?
- Medicingennemgangspakken
- Højriskomedicinpakken
- Indikatorer
- www.sikkerpsykiatri.dk



Patientsikkerhedspakke

- Tre til fem handlinger (elementer), som, klinikere er enige om, er vigtige for patientgruppen
- Elementerne er så vidt muligt indbyrdes uafhængige
- Målrettet en velafgrænset patientgruppe på et bestemt sted
- Elementerne er beskrevet, så der er mulighed for lokal tilpasning og klinisk skøn
- Målet er, at mindst 95 % af patienterne modtager alle pakkens elementer (alt-eller-intet)



	Per	Ib	Ulla	Mads	Mette	Karen	Kurt	Kaj	Nete	Hans	%
Element 1											90 %
Element 2											90 %
Element 3											90 %
Element 4											90 %
Element 5											90 %
Hele pakken											50 %



Indikatorer

- Resultatindikatorer
 - Patientens stemme: Er resultatet godt nok?
- Procesindikatorer
 - Systemets stemme: Fungerer vores processer?



Indikatorer: Eksempel

Resultatindikator	Procesindikator
Dage mellem tryksår	Andel patienter, der screenes for tryksårsrisiko
Dage mellem forgiftningstilfælde	Andel patienter i behandling med højrisikomedicin, der følges klinisk og paraklinisk



Medicingennemgangspakken



Formål

- At undgå uhensigtsmæssige lægemiddelkombinationer
- At optimere den medicinske behandling



To trin

- Medicinafstemning
 - Ved alle indlæggelser, overflytninger og udskrivninger
- Medicingennemgang
 - Ved alle indlæggelser
 - Ved alle ambulante forløb



Medicinafstemning – elementer:

- Tilstedeværelse af medicinanamnese
- Tilstedeværelse af medicinordination
- Afstemning af medicinanamnese og medicinordination



Medicingennemgang – elementer

- Tilstedeværelse af afstemt medicinliste
- Systematisk vurdering og dokumentation af patientens oplevelse af behandlingen
- Kritisk gennemgang af medicinlisten



Kritisk gennemgang – hvordan?

- Efter lokale retningslinjer
- Kan tage udgangspunkt i IRF's fem spørgsmål:
 - For hvad?
 - For meget?
 - For lidt?
 - Forkert?
 - For ever?



Pakken vs. DDKM 1

- Er der problemer med compliance?
- Er der uhensigtsmæssige bivirkninger?
- Skal behandlingen fortsætte?
- Skal der skiftes til et mere hensigtsmæssigt præparat?
- Skal dosis justeres?
- Er der indikation for nye lægemidler?
- Er der interaktion med patientens andre lægemidler?



Pakken vs. DDKM 2

- DDKM:
 - En sådan systematisk gennemgang er ikke relevant for alle patienter.
- Sikker Psykiatri:
 - Medicingennemgang for alle patienter



Intermediære resultatindikatorer

- Andel patienter i antipsykotisk polyfarmaci
 - Højst 25 %
- Andel patienter i samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner
 - Højst 30 %



Procesindikatorer, mål > 95 %

- Andel patienter med nedtrapningsplan for benzodiazepiner
- Andel patienter med overgangsplan ved nyordination af antipsykotika
- Procent situationer med medicinafstemning
- Procent patienter, der har fået foretaget medicingennemgang



Højriskomedicinpakken



Hvad er højriskomedicin?

- Lægemidler med en forhøjet risiko for alvorlig patientskade ved forkert anvendelse
 - fx snævert terapeutisk index
 - hyppig forekomst af alvorlige bivirkninger
 - fejlagtig anvendelse eller håndtering



Sikker Psykiatri

- Litium
- Clozapin
- Tricykliske antidepressiva



Højriskomedicin – elementer

- Tjek ind
 - Indikation er til stede
 - Relevant klinisk og paraklinisk undersøgelse udført og dokumenteret
 - Patienten har afgivet informeret samtykke til behandlingen
 - Patienten er informeret om tidspunktet for næste kontrol af behandlingen
- Løbende klinisk og paraklinisk monitorering udføres



Resultatindikator

- Dage mellem forgiftningstilfælde med højriskomedicin



Procesindikator

- Andel patienter med tjek ind ved iværksættelse af behandling med højriskomedicin



Seneste version af alle dokumenter:

www.sikkerpsykiatri.dk

