



# INDIKATORER FOR **MEDICINPAKKERNE**



Sikker Psykiatri

# Indikatorer for medicinpakkerne

I projektet Sikker Psykiatri indgår en række løbende målinger, der har til formål at støtte og monitorere forbedringsprocessen. Mere om målestrategien i Sikker Psykiatri kan læses i dokumentet "Målestrategi", der findes på [www.sikkerpsykiatri.dk](http://www.sikkerpsykiatri.dk).

Formålet med dette dokument er at give en operationel definition af de indikatorer, der anvendes i Sikker Psykiatri vedrørende de to medicineringsskaber, medicingennemgang og højrisikomedicin. For en nærmere diskussion omkring typer af indikatorer og principper for målinger henvises til baggrundspapiret på projektets hjemmeside.

Der knytter sig to resultat- og fem procesindikatorer til medicingennemgangspakken. For højrisikomedicin findes én resultat og én procesindikator.

## Resultatindikatorer - medicingennemgang

### Andel patienter i antipsykotisk polyfarmaci

Type	Intermediær resultatindikator
Målsætning	Højest 25 %
Nævnerdefinition	Antal udskrivelser, hvor medicinlisten ved udskrivelse indeholder mindst ét antipsykotikum.
Tællerdefinition	Den andel af udskrivelserne i nævneren, hvor medicinlisten indeholder mindst to antipsykotika.
Datakilder	Lokal opgørelse. Kan muligvis opgøres via Den Nationale Skizofrenidatabase.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på en stikprøve på fx 3-5 tilfældige udskrivelser fra dagen i forvejen. Er der under seks udskrivelser indgår alle i stikprøven. Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren dagligt eller ugentligt således, at der indgår mindst ti og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	P-diagram

## Andel patienter i samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner

Type	Intermediær resultatindikator
Målsætning	Højest 30 %
Nævnerdefinition	Antal udskrivelser, hvor medicinlisten ved udskrivelse indeholder mindst ét antipsykotikum.
Tællerdefinition	Den andel af udskrivelserne i nævneren, hvor medicinlisten indeholder mindst ét benzodiazepin.
Datakilder	Lokal opgørelse. Kan muligvis opgøres via Den Nationale Skizofrenidatabase.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på en stikprøve på fx 3-5 tilfældige udskrivelser fra dagen i forvejen. Er der under seks udskrivelser indgår alle i stikprøven. Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren dagligt eller ugentligt således, at der indgår mindst ti og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	P-diagram

## Procesindikatorer - medicingennemgang

### Andel patienter med nedtrappingsplan for benzodiazepiner

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal udskrivelser, hvor medicinlisten ved udskrivelse indeholder mindst ét benzodiazepin.
Tællerdefinition	Den andel af udskrivelserne i nævneren, hvor udskrivelsesnotatet og/eller epikrisen indeholder en beskrivelse af, hvordan det eller de benzodiazepiner, som patienten tager forventes nedtrappet. Hvis notatet i stedet indeholder en begrundelse for, hvorfor patienten ikke forventes nedtrappet, opfylder dette også tællerdefinitionen.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på en stikprøve på fx 3-5 tilfældige udskrivelser fra dagen i forvejen. Er der under seks udskrivelser indgår alle i stikprøven. Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren dagligt eller ugentligt således, at der indgår mindst ti og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram

## Andel patienter med overgangsplan ved nyordination af antipsykotika

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal udskrivelser, hvor medicinlisten ved udskrivelse indeholder flere antipsykotika end ved indlæggelse.
Tællerdefinition	Den andel af udskrivelserne i nævneren, hvor udskrivelsesnotatet og/eller epikrisen indeholder en beskrivelse af, hvordan patienten skal overgå til det nyordinerede antipsykotikum. Hvis notatet i stedet indeholder en begrundelse for, hvorfor patienten skal fortsætte behandling med flere antipsykotika, opfylder dette også tællerdefinitionen. For patienter, hvor det af journalen fremgår, at overgang fandt sted under indlæggelse, anses indikatoren for opfyldt.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på en stikprøve på fx 3-5 tilfældige udskrivelser fra dagen i forvejen. Er der under seks udskrivelser indgår alle i stikprøven.  Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren dagligt eller ugentligt således, at der indgår mindst ti og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram

## Procent situationer med medicinafstemning

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal situationer, hvor medicinafstemning kræves. Medicinafstemning skal foretages ved indlæggelse, overflytning og udskrivelse. En indlæggelse, overflytning eller udskrivelse udgør én situation.
Tællerdefinition	Antal situationer, hvor hvor alle elementer i medicinafstemningen er opfyldt.  Der tælles, om medicinafstemning er udført, ikke om der blev fundet fejl eller lavet korrektioner.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på en stikprøve på fx 3-5 tilfældige indlæggelser, overflytninger og udskrivelser fra dagen i forvejen. Er der under 6 indlæggelser, overflytninger eller udskrivelser indgår alle i stikprøven.  Afhængig af stikprøvestørrelsen opgøres indikatoren dagligt eller ugentligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram

## Procent patienter, der har fået foretaget medicingennemgang

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal udskrevne patienter
Tællerdefinition	Antal udskrevne patienter, hvor alle elementer i medicingennemgang er opfyldt.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på den foregående dags udskrivelser. Afhængigt af antallet af indlæggelser opgøres indikatoren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram

## Resultatindikatorer - højrisikomedicin

### Dage mellem forgiftningstilfælde med højrisikomedicin

Type	Resultatindikator
Målsætning	Ingen forgiftningstilfælde
Tællerdefinition	Dage mellem de to seneste forgiftningstilfælde (inkl. dødsfald) med lægemidler omfattet af højrisikomedicinpakken.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Opgørelsen sker på afsnits- eller klinikniveau. Hver gang der optræder et forgiftningstilfælde (inkl. dødsfald) noteres datoen og antallet af dage siden seneste tilfælde udregnes. Har afdelingen tilføjet egne lægemidler til listen over højrisikomedicin opgøres indikatoren selvstændigt for disse egne lægemidler.
SPC diagram	Seriediagram eller T-diagram

## Procesindikatorer - højriskmedicin

### Andel patienter med tjek ind ved iværksættelse af behandling med højriskmedicin

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal patienter med nyordination af højriskmedicin
Tællerdefinition	Det antal af patienterne i nævneren, hvor der ved iværksættelse af behandlingen blev foretaget tjek ind. Hvis der ved tjek ind forelå relativ kontraindikation mod behandlingen, og det ikke er begrundet, hvorfor denne alligevel er iværksat, regnes tjek ind ikke som opfyldt. Hvis behandlingen er iværksat imod patientens vilje, regnes element c som opfyldt.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau på alle den foregående dags nyordinationer af højriskmedicin. Afhængigt af antallet af indlæggelser opgøres indikatoren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20-40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram